

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Медитонзин®

Регистрационный номер

Торговое наименование: Медитонзин®

Международное непатентованное или группировочное наименование: не присвоено

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические

Состав

1 г препарата содержит:

Действующие вещества:

Aconitinum (Аконитинум) D 5	0,10 г
Atropinum sulfuricum (Атропинум сульфурikum) D 5	0,50 г
Mercurius cyanatus (Меркуриус цианатус) D 8	0,40 г

Вспомогательные вещества:

Смесь этанол 94% (по массе), глицерин 85%, вода очищенная в объемном соотношении	5:10:85
---	---------

Описание

Прозрачный бесцветный или слегка желтоватый раствор.

Фармакотерапевтическая группа: гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Комплексный гомеопатический препарат, фармакологическое действие которого обусловлено активными компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

В составе комплексной терапии для симптоматического лечения гриппа, парагриппозных и острых респираторных заболеваний, заболеваний ЛОР- органов и верхних дыхательных путей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 1 года (опыт клинического применения недостаточен).

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст старше 1 года (препарат содержит этиловый спирт).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутрь; перед проглатыванием подержать некоторое время во рту. Принимать препарат следует за 20-30 минут до или после приема пищи. При острой стадии заболевания следует принять первую дозу препарата как можно раньше, при появлении первых симптомов заболевания. Препарат рекомендуется принимать каждые 30 минут – 1 час (но не более 12 раз в сутки) в течение 1 -2 дней. После наступления улучшения частоту приема препарата уменьшают до 1-3 раза в день. Продолжительность курса лечения по назначению врача. Длительность лечения в среднем составляет 7 дней.

Однократная доза:

- дети от 1 года до 6 лет: 2-5 капель;
- дети от 6 до 12 лет: 3-6 капель;
- взрослые и дети старше 12 лет: 5-10 капель.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции и крайне редко повышенное слюноотделение.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу**.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Чем раньше начато лечение, тем быстрее и эффективнее действие препарата. При приеме гомеопатических препаратов могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае отсутствия улучшения при остром течении заболевания по истечении 2 дней препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Препарат содержит этиловый спирт.

Содержание этанола в однократной и суточной дозе:

Возрастные категории	М а к с . р а з о в а я доза	С о д е р ж а н и е э т а н о л а в разовой дозе	Суточная доза	С о д е р ж а н и е э т а н о л а в суточной дозе
<u>дети от 1 года до 6 лет:</u>	5 капель	0,0000166 г	60 капель	0,0001999 г
<u>дети от 6 до 12 лет:</u>	6 капель	0,0000199 г	72 капли	0,0002399 г
<u>взрослые и дети старше 12 лет</u>	10 капель	0,0000333 г	120 капель	0,0003999 г

Концентрации алкоголя в крови, которые могут быть достигнуты при приеме препарата Медитонзин® в рекомендованных дозах, составляют значения, не превышающие эндогенную концентрацию алкоголя в крови. Тем не менее, не следует превышать рекомендуемые дозы, так как превышение дозы может снизить скорость психомоторных реакций.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами)

Форма выпуска

Капли для приема внутрь гомеопатические. По 35 г и 70 г во флаконы из темного стекла III гидrolитического класса, закупоренные полипропиленовой крышкой в комплекте с крышкой – капельницей из полиэтилена.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок хранения вскрытого флакона – 3 месяца.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель:

Медице Арцнаймиттель Пюттер ГмбХ & Ко. КГ, Куловег 37, 58638 Изерлон, Германия.

Организация, принимающая претензии:

АО «Биннофарм», 124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 3, стр. 1. Тел/факс: (495) 510-32-88; эл. почта: info@binnopharm.ru